

PREVENCIÓN DE PIQUETES DE AGUJAS

¡AY!

Las lesiones por piquetes de agujas casi siempre son leves, pero pueden ser severas.

Lesiones comunes

- Infecciones en la piel
- Reacciones alérgicas
- Heridas en los tejidos profundos que requieren cirugía

No se pique

- Hágalo despacio - no se apure con las inyecciones
- Asegure/amarre los animales adecuadamente
 - » Pida ayuda de sus compañeros
 - » Use el equipo y las técnicas correctas
- No vuelva a colocar el cubre agujas
- No ponga las agujas/jeringas en las bolsas de su ropa
- No ponga el cubre agujas en su boca
- Deshágase de agujas dobladas o inservibles
- Use los recipientes aprobados para productos filosos para deshacerse de las agujas

EN LA GRANJA

¿Sabía usted que...?

- Cerca del 80% de los trabajadores que vacunan animales en las granjas se pican accidentalmente ellos mismos.
- Las vacunas son los medicamentos más comunes en las lesiones causadas por piquetes de agujas.

¿Se picó?

- Lave la piel con jabón y agua inmediatamente
- Reporte la lesión a su supervisor
- Llame a su proveedor de salud

Tenga cuidado

Especialmente con estos productos:

Tilmicosin (Micotil®)

Sedantes (por ejemplo Xylazine)

Productos o vacunas a base de aceite

Vacuna de Brucella abortus Strain RB51

Vacunas atenuadas (por ejemplo la vacuna Erysipelas)

Vacuna Johne's

Hormonas - especialmente si está embarazada

Antibióticos - especialmente si es alérgico

MAYOR INFORMACIÓN:

umash.umn.edu/needlestick

www.cdc.gov/niosh/stopsticks/sharpsinjuries.html



Funding for this publication was made possible (in part) by the cooperative agreement award U54OH010170 for the Centers for Disease Control and Prevention. The views expressed do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human Services, nor does mention of trade names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the U.S. Government.

